

Kerncijfers roken in Nederland

Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag

28% rookt

27% doet stoppoging

25 miljard verkochte sigaretten

20.000 sterfgevallen door roken



STIVORO

2009

Inhoudsopgave

Roken	Pagina 3
Stoppen	Pagina 5
Kopen	Pagina 7
Gezondheid	Pagina 8
Bronnen	Pagina 9
Bronvermelding	Pagina 10

Roken

Percentage rokers

28%

28% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2009 wel eens (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Aantal rokers

3.754.163

3.754.163 personen (95% betrouwbaarheidsinterval van 3.670.074 tot 3.838.252 personen) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookten in 2009 wel eens (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage rokende jongeren

21%

21% van de Nederlandse jongeren van 10 tot en met 19 jaar had in 2009 in de afgelopen vier weken gerookt (bron: Roken Jeugd Monitor).

Aantal rokende jongeren

427.353

427.353 personen (95% betrouwbaarheidsinterval van 403.656 tot 451.051 personen) van de Nederlandse bevolking van 10 tot en met 19 jaar rookten in 2009 wel eens (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Roken Jeugd Monitor).

Aantal sigaretten per dag

14

Gemiddeld rookte de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die wel eens rookte in 2009 14 sigaretten en/of shagjes per dag (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage sigarettenrokers

18%

18% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2009 wel eens sigaretten (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage shagrokers

13%

13% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2009 wel eens shag (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage sigarenrokers

4%

4% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2009 wel eens sigaren of cigarillo's (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage elektronische sigaretrokers

1%

1% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2009 wel eens een elektronische sigaret (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage pijpokers

1%

1% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2009 wel eens pijp (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten)

Stoppen

Stopratio (quit ratio)

55%

De stopratio of quit ratio is het percentage ex-rokers van de mensen die roken en die ooit gerookt hebben en was onder Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2009 55% (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage dat stoppoging doet in een jaar

27%

27% van de (ex)rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder had in 2009 in het afgelopen jaar een stoppoging gedaan (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Aantal dat stoppoging doet in een jaar

1.030.518

1.030.518 personen (95% betrouwbaarheidsinterval van 986.970 tot 1.073.315 personen) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zijn in 2009 gestopt met roken (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Succespercentage stoppogingen na een jaar

1-7%

1 tot 7% van de rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die in 2008 een stoppoging had gedaan, had tot en met een jaar na de stoppoging (in 2009) geen enkele sigaret of shagje gerookt (bron: International Tobacco Control Netherlands Survey).

Percentage rokers ooit stoppoging gedaan

65%

65% van de rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaf in 2009 aan dat ze ooit een serieuze stoppoging hadden gedaan (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage rokende jongeren ooit stoppoging gedaan

46%

46% van de Nederlandse jongeren van 10 tot en met 19 jaar die in de afgelopen vier weken gerookt hebben, gaf in 2009 aan dat ze ooit een stoppoging hadden gedaan (bron: Roken Jeugd Monitor).

Gemiddeld aantal stoppogingen ooit gedaan door ex-rokers

2,3

De ex-rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaven in 2009 aan dat ze gemiddeld 2,3 stoppogingen hadden ondernomen in het verleden (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Gemiddeld aantal stoppogingen ooit gedaan door rokers

2,2

De rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaven in 2009 aan dat ze gemiddeld 2,2 stoppogingen hadden ondernomen in het verleden (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage hulpmiddelen gebruikt bij laatste stoppoging

34%

34% van de (ex)rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die in 2009 aangaven in het afgelopen jaar een stoppoging te hebben gedaan, hebben daarbij een hulpmiddel of hulpmethode gebruikt. (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage van plan om te stoppen

78%

78% van de rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaf in 2009 aan van plan te zijn om in de toekomst te stoppen met roken (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Kopen

Aantal verkochte sigaretten

14.905 mlj

14.905 miljoen sigaretten zijn er in 2008 verkocht (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Aantal verkochte shagjes

10.348 mlj

10.348 miljoen shagjes zijn er in 2008 verkocht (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Prijs van een pakje sigaretten

€4,50

€4,50 was in 2009 de consumentenprijs van een pakje sigaretten van 19 stuks van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Prijs van een pakje shag

€5,50

€5,50 was in 2009 de consumentenprijs van een pakje shag van 50 gram van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Accijns per pakje sigaretten

€2,60

€2,60 was in 2009 de accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Accijns per pakje shag

€2,84

€2,84 was in 2009 de accijns op een pakje shag van 50 gram van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Gezondheid

Op het moment van verschijnen van deze Kerncijfers komen de meest recente cijfers over gezondheid en roken uit 2007.

Hieronder staan de sterfgevallen door roken onder rokers. Er zijn geen recente cijfers uit Nederland beschikbaar over het aantal sterfgevallen door roken onder meerokers. Volgens een schatting van de Gezondheidsraad uit 2003¹ sterven er per jaar enkele honderden meerokers door longkanker en enkele duizenden door hartaandoeningen.

Totaal aantal sterfgevallen door roken

19.522

19.522 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2007 gestorven door een aan roken gerelateerde ziekte (bron: CBS doodsorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door longkanker ten gevolge van roken

8.321

8.321 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2007 gestorven door longkanker ten gevolge van roken (bron: CBS doodsorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door andere kankersoorten ten gevolge van roken

1.696

1.696 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2007 gestorven door andere kankersoorten ten gevolge van roken (bron: CBS doodsorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door astma en COPD ten gevolge van roken

4.992

4.992 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2007 gestorven door astma of COPD ten gevolge van roken (bron: CBS doodsorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten ten gevolge van roken

4.513

4.513 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2007 gestorven door hart- en vaatziekten ten gevolge van roken (bron: CBS doodsorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Gezondheidsraad (2003). *Volksgezondheidsschade door passief roken*. Den Haag: Gezondheidsraad, publicatie nr. 2003/21.

Bronnen

Continue Onderzoek Rookgewoonten

Het Continue Onderzoek Rookgewoonten (COR) is een continu vragenlijstonderzoek dat via internet wordt uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van STIVORO. Wekelijks wordt er een landelijk gespreide steekproef van steeds andere personen uit TNS NIPObase ondervraagd. In 2009 zijn 28.360 Nederlanders gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek en hebben 19.693 Nederlanders (69%) daadwerkelijk deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn herwogen naar sekse, werkzaamheid, leeftijd, gezinsgrootte, opleiding, provincie en gemeentegrootte. Meer informatie: www.stivoro.nl/volwassenen/feitencijfers.

Roken Jeugd Monitor

De Roken Jeugd Monitor (RJM) is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek onder steeds andere jongeren van 10 tot en met 19 jaar. Dit onderzoek wordt door middel van persoonlijke interviews afgenomen door TNS NIPO in opdracht van STIVORO. In 2009 hebben van 16 maart tot en met 8 mei 4.585 jongeren deelgenomen aan het onderzoek. De enquêteurs hadden de instructie om de vraaggesprekken af te nemen buiten de aanwezigheid van leerkrachten, ouders en leerlingen. De onderzoeksresultaten zijn herwogen naar sekse, leeftijd, schooltype en provincie. Meer informatie: www.stivoro.nl/jongeren/feitencijfers.

International Tobacco Control Netherlands survey

Het Nederlandse gedeelte van het International Tobacco Control Policy Evaluation Project (het ITC onderzoek) is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek onder dezelfde personen die in maart/april 2008 minstens maandelijks rookten, in hun leven minstens 100 sigaretten hadden gerookt, en 15 jaar of ouder waren. Het onderzoek wordt via internet uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van STIVORO. In 2009 hebben 1.447 van de 1.820 respondenten (80%) die in 2008 meededen weer meegedaan aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn herwogen naar sekse, leeftijd, gezinsgrootte, opleiding, provincie en internetgebruik. Meer informatie: www.itcproject.org en www.stivoro.nl/lopendonderzoek.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haalde het aantal personen in Nederland van 15 jaar en ouder in 2009 uit het bevolkingsregister. De totale verkoop van sigaretten in 2009 is berekend op basis van banderol afgifte gegevens van het Ministerie van Financiën. Het shagverbruik is berekend op basis van 1 gram tabak per gerolde sigaret. De CBS doodsoorzakenstatistiek is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland. De doodsoorzakenstatistiek wordt bewerkt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om inzicht te krijgen in de sterfgevallen door aan roken gerelateerde ziekten. Meer informatie: www.cbs.nl en http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1208n19085.html.

Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën stelde de accijnzen op sigaretten en shag in 2009 vast in de Factsheet Belastingtarieven 2009. Meer informatie: www.minfin.nl/ejb2009.

BRONVERMELDING

© Overname met bronvermelding toegestaan. De correcte bronvermelding is: STIVORO – voor een rookvrije toekomst (2010). Kerncijfers roken in Nederland 2009. Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag. Den Haag: STIVORO – voor een rookvrije toekomst.

Samenstelling: G. E. Nagelhout

Datum: 27 januari 2010

Correspondentieadres: Postbus 16070, 2500 BB Den Haag

Kantooradres: Parkstraat 83 Den Haag

T 070 312 04 00

F 070 312 04 95

E info@stivoro.nl

I www.stivoro.nl

KvK Den Haag S200798

STIVORO – voor een rookvrije toekomst *is een initiatief van het Astma Fonds, de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding*

